کیڑے مار زہر
(صرف زرعی استعمال کیلئے)

کاربو فیوران 3 جی

3 فیصد دانے دار

CARBOFURAN 3G

Registration No.: (GENERIC) / DPP / 2017 (7039)

خطرہ زہر
قدرے خطرناک

Ingredients:
Carbofuran (A.I.):................ 3% w/w (30 gm/kg)
Other:............................... 97% w/w

- بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں • حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں • استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- تریاق: زہر کے مضر اثرات کی صورت میں ایٹروپین سلفیٹ 2 ملی گرام کا انجکشن لگائیں

انتباہ: یہ زہر ہے ! احتیاط سے استعمال کریں

8 کلوگرام

Arysta LifeScience

CARBOFURAN 3G

کاربو فیوران 3 جی

3 فیصد دانے دار

کاربو فیوران 3 جی ایک سرائیت پذیر کیڑے مار زہر ہے جو کہ کماد، مکئی اور چاول کی فصل میں موجود نقصان دہ تنے کی سنڈی (بوررز) کو کھانے اور چھونے سے مارتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	کیڑے	مقدار فی ایکڑ	وقفہ برائے برداشت	REI
مکئی	سنڈیاں (بوررز)	8 کلوگرام	35-30 دن	48 گھنٹے
کماد	سنڈیاں (بوررز)	14 کلوگرام		
چاول	تنے کی سنڈیاں (بوررز)	10 کلوگرام		

طریقہ ءاستعمال

فصل	طریقہ ءاستعمال
مکئی	پہلی زہرپاشی: پہلی زہر پاشی 8 کلوگرام فی ایکڑ کے حساب سے بوائی کے وقت بیج کے ساتھ ڈالیں۔ یا فصل جب تقریباً 1 سے ½1 فٹ ہو جائے تو 8 کلوگرام فی ایکڑ کے حساب سے کونپلوں میں ڈالیں دوسری زہرپاشی: پہلی زہر پاشی کے 20 دن بعد یا جب فصل ½2 سے 3 فٹ کی ہو جائے تو کونپلوں میں ڈالیں۔
کماد	پہلی زہر پاشی بحساب 14 کلوگرام فی ایکڑ بجائی کے ساتھ یا بجائی کے تقریباً 30 دن بعد کریں۔ دوسری زہر پاشی بحساب 14 کلوگرام فی ایکڑ، آخری گوڈی کے بعد مٹی چڑھاتے وقت کریں۔
چاول	(نرسری) نرسری کی کاشت سے پہلے 10 گرام فی مربع میٹر، 3 سے 5 سینٹی میٹر گہرائی تک زمین میں ملائیں۔ (اری) پہلی زہر پاشی 10 کلوگرام فی ایکڑ، پنیری کی منتقلی کے 25 دن بعد کریں۔ دوسری زہر پاشی بحساب 10 کلوگرام فی ایکڑ، پنیری کی منتقلی کے 55 دن بعد کریں۔ (باسمتی) پہلی زہر پاشی 10 کلوگرام فی ایکڑ، پنیری کی منتقلی کے 35 دن بعد کریں۔ دوسری زہر پاشی بحساب 10 کلوگرام فی ایکڑ، پنیری کی منتقلی کے 65 دن بعد کریں۔

- **حفاظتی تدابیر:** ☆ زہر ڈالتے وقت دستانے اور حفاظتی ماسک ضرور پہن لیں ☆ زہر ہوا کے مخالف سمت میں ہرگز نہ ڈالیں ☆ زہر پاشی کے دوران تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے پرہیز کریں ☆ دوائی ڈالنے کے بعد کھلے پانی سے نہائیں اور کپڑے دھولیں ☆ زہر آلود کھیت سے جڑی بوٹیاں نکال کر مویشیوں کو نہ ڈالیں زہر کے خالی تھیلوں کو یا تو جلا دیں یا آبادی سے دور کہیں مقرر کردہ جگہ پر دفن کر دیں ☆ نہری پانی کو آلودہ نہ کریں ☆ زہر مچھلیوں اور آبی حیات کیلئے خطرناک ہے۔
- **ابتدائی طبی امداد:** اگر بے احتیاطی کی وجہ سے دوا کا زہریلا اثر ہو جائے تو مریض کو سایہ دار جگہ پر لٹا دیں اور تمام زہر آلود کپڑے اُتار دیں۔ جسم کے متاثرہ حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ زہریلے اثرات ظاہر ہونے پر ہاتھ، چہرہ، ناک، آنکھیں یا جسم کا وہ حصہ جو زہر آلود ہو، فوراً کثرت سے پانی استعمال کر کے دھوئیں۔ آنکھوں کو کم از کم 10-15 منٹ تک صاف پانی سے دھوئیں۔ اگر اتفاق سے نگل لیا ہو تو ایک یا دو گلاس نمک ملا نیم گرم پانی پلائیں اور پھر اس کے گلے میں انگلی ڈال کر قے کروائیں اور جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
- **سٹوریج:** زہر کو مقررہ معیار تک اسٹور کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ زہر کو اس کی اصل پیکنگ میں سورج کی روشنی، گرمی و نمی سے دور رکھا جائے۔
- **گارنٹی:** یہ زہر تھیلے پر درج خصوصیات کے مطابق اور مجوزہ استعمال کے لئے موزوں ہے چونکہ زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے اس لئے ہم صرف اس کے معیاری ہونے کی ضمانت دے سکتے ہیں تاہم غلط طریقے سے رکھنے یا استعمال کرنے کی صورت میں نقصان کی ذمہ داری تیار کنندگان، تقسیم کنندگان یا نمائندگان پر ہرگز نہ ہوگی۔
- **اشتراک:** زہر کو دوسری زہروں کے ساتھ ملا کر ڈالا جا سکتا ہے بشرطیکہ اُن میں الکلی شامل نہ ہو۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metaled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0C° and above 35C° But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Formulated & Packed By:
Pesticon Industries
Tayyaba Industrial Zone, 19 Km lahore Road, Sheikhupura.
(Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan)

Technical Imported By:
M/s. Nuchem (Pvt.) Ltd.,
187, Industrial Estate, Phase II, Multan.

Manufactured By:
M/s. Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry Group Co. Ltd.
Ciyao Town, Ningyang County, Shandong Province, China.

:- تقسیم کنندگان :-

اَریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

تھرڈ فلور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون: 3-34522611 (21-92+)

www.upl-ltd.com/pk

کاربو فیوران