

ایلو مینیم فاسفائیڈ

ٹیلیٹ 56 نمبر

ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں سے موثر تحفظ



اریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ



پاکستان میں زراعت کا شعبہ جہاں زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی طرف کوشاں ہے وہیں، پیدا شدہ زرعی اجناس محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنے، اس کو کیڑوں اور موسمی اثرات سے بچانے کی بھی اشد ضرورت ہے تاکہ ذخیرہ شدہ قیمتی اجناس کو نقصانات سے بچایا جاسکے اور بڑھتی انسانی آبادی کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کیا جاسکے۔

آریسٹا لائف سائنس ذخیرہ شدہ اجناس کو کیڑوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کیلئے ایک معیاری فیوٹیکینٹ ایلومینیم فاسفائیڈ متعارف کروا رہا ہے۔

ایلومینیم فاسفائیڈ

ٹیلیٹ 56 فیصد

ایلومینیم فاسفائیڈ کا طریقہ کار:

ایلومینیم فاسفائیڈ ایک مؤثر اور تیز اثر فیوٹیکینٹ ہے۔ پیکنگ کھلنے پر ایلومینیم فاسفائیڈ کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ ملکر ایک خطرناک گیس فاسفین (Phosphine) خارج کرتی ہیں۔ جو ذخیرہ شدہ اجناس میں موجود کیڑوں کے نظام تنفس اور اعصابی نظام کو تباہ کر کے ان کا خاتمہ کرتی ہیں۔ ایلومینیم فاسفائیڈ ذخیرہ شدہ اجناس کے کیڑوں اور کھیتوں میں چوہوں کے کنٹرول کیلئے مؤثر ہے۔

ایلومینیم فاسفائیڈ کی خصوصیات:

- ◀ زرعی اجناس نقصان دہ کیڑوں کے ممکنہ حملے سے محفوظ رہتے ہیں۔
- ◀ ایلومینیم فاسفائیڈ ذخیرہ شدہ زرعی اجناس کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کی تمام حالتوں یعنی انڈوں سے لے کر بالغ تک کیلئے مہلک اور جان لیوا ہے۔
- ◀ ایلومینیم فاسفائیڈ میں موجود فوسفین گیس کا پھیلاؤ برابر اور بہت تیز ہے اور یہ باآسانی گودام اور کنٹینرز کے کونوں میں پہنچ جاتی ہے۔
- ◀ ایلومینیم فاسفائیڈ کی ایلومینیم پیکنگ ایلومینیم فاسفائیڈ کی بہترین کوالٹی کی ضمانت ہے۔

ایلومینیم فاسفائیڈ کا دائرہ استعمال:

- ◀ گودام یا تریال میں ذخیرہ کی گئی اجناس اور پیک کی ہوئی اشیاء:
- ◀ تمام دالیں
- ◀ تمام اناج (گندم، چاول، مکئی، جوار، باجرہ وغیرہ)
- ◀ تمباکو
- ◀ کپاس کی گٹھائیں
- ◀ تیل دار اجناس (سورج کھئی)

ایلو مینیم فاسفانیڈ کا دائرہ اثر:

غلہ کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے:

گندم کی سسری (Brown Grain Beetle)
 سوٹہ والی سسری (Rice Weevil)
 چاول کا پتنگا (Rice Mouth)
 پنے کا ڈھورا (Pulse Beetle)
 چوٹی بھونڈی (Saw Toothed Grain Beetle)

کھرا (Khapra Beetle)
 آنے کی سسری (Red Flour Beetle)
 گندم کا پروانہ (Angoumois Grain Moth)
 ہندی پتنگا (Indian Meal Mouth)
 چوٹی بھونڈی (Flat Grain Beetle)



ایلو مینیم فاسفانیڈ فیوٹیکیشن کہاں کہاں اور کس طریقے سے کی جاتی ہے؟

اسٹور کے ندر ڈھانپ کر رکھی گئی زرعی اجناس (بور یوں میں):

- ▶ گولیوں کی مقدار بلحاظ حجم گن لیں۔
- ▶ ایلو مینیم فاسفانیڈ کی گولیوں کو کپڑے کی تھیلی میں رکھیں تاکہ فیوٹیکیشن کے بعد گولیوں کے باقیات کو با آسانی زائل کیا جاسکے۔
- ▶ کپڑے کی تھیلی میں رکھی گئی گولیوں کو گودام میں بور یوں کے بیچ اور اوپر ایسی جگہ رکھیں جہاں سے گیس با آسانی پورے گودام میں پھیل سکے، اور جہاں گولیاں رکھی جائیں وہاں نشان لگا دیں۔
- ▶ گولیاں رکھنے کے بعد بور یوں کو گیس ٹائٹ رکھنے کیلئے ترپولیس کی چادر استعمال کریں اور بور یوں کے حجم کو ڈھانپ دیں اور مٹی کو بور یوں سے اچھی طرح ترپولیس کی چادر کو بند کر دیں تاکہ ہوا کا گزر نہ ہو سکے۔
- ▶ گودام کے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں تاکہ ہوا کا گزر نہ ہو سکے۔
- ▶ گودام کے داخلی دروازوں پر پارہ کی طرف سے نوٹس لگا دیں (یہاں ایلو مینیم فاسفانیڈ سے فیوٹیکیشن جاری ہے)۔

بڑے حجم والے گوداموں میں جہاں زرعی اجناس خام مال کی صورت میں ہو (بغیر ڈھانچی ہوئی)

- ◀ فیوٹیکیشن کرنے سے پہلے گودام کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔
- ◀ گولیاں کی تعداد کو بلحاظ حجم زرعی اجناس گن لیں۔
- ◀ اہلیکیٹر کی مدد سے گولیاں کو زرعی اجناس میں 3 سے 4 فٹ گہرائی تک پہنچادیں۔
- ◀ ممکن ہو سکے تو خام زرعی اجناس کو ترپالیں کی چادر سے ڈھانپ دیں۔
- ◀ تمام دروازے اور کھڑکیاں ماسٹنگ ٹیپ لگا کر بند کردیں اور داخلی دروازوں پر نوٹس لگادیں (یہاں ایلومینیم فاسفائیڈ سے فیوٹیکیشن جاری ہے)۔

خانگیو داموں، فلورملوں اور کنٹینرز کی فیوٹیکیشن:

- ◀ گولیوں کی مقدار کو بلحاظ حجم گن لیں۔
- ◀ فیوٹیکیشن سے پہلے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔
- ◀ گولیوں کو کپڑوں میں باندھ کر گودام کی ایسی جگہوں پر رکھیں جہاں سے پورے گودام میں گیس پھیل سکے۔
- ◀ ساری کھڑکیاں اور دروازے ماسٹنگ ٹیپ لگا کر بند کردیں تاکہ ہوا کا گزرنہ ہو سکے۔
- ◀ داخلی دروازوں پر نوٹس لگادیں (یہاں ایلومینیم فاسفائیڈ سے فیوٹیکیشن جاری ہے)۔

کھیتوں میں موجود چوہوں، سانپ اور کیڑوں کیلئے فیوٹیکیشن:

- ◀ سب سے پہلے کھیت میں چوہوں اور سانپ کے بل تلاش کریں اور اس میں کاغذ پھنسا دیں تاکہ جب چوہا یا سانپ اپنے بل میں آئے یا جائے تو کاغذ وہاں سے ہٹ جائے اور آپ صحیح جگہ پر ایلومینیم فاسفائیڈ کا استعمال کر سکیں۔
- ◀ کھیت میں صحیح سوراخوں کی نشاندہی پر وہاں اہلیکیٹر کی مدد سے ایلومینیم فاسفائیڈ کی گولیاں اندر ڈال دیں اور سوراخ کو مٹی کا گارابنا کر بند کردیں۔



ہدایات برائے استعمال:

- ▶ ایلومینیم فاسفائیڈ کی کل مطلوبہ مقدار گودام یا پلاسٹک کی تریپل کے اندر پھیلانے کا کام زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے میں مکمل کیا جائے، ضرورت کے مطابق آدمیوں کی تعداد بڑھا لیں۔
- ▶ اکیلا آدمی فیوٹیکیشن کا کام ہرگز نہ کرے نیز فاسفین گیس سے محفوظ رکھنے والا گیس ماسک موقع پر موجود ہونا چاہیے تاکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جاسکے۔
- ▶ فیوٹیکیشن کیلئے گئے اسٹور میں داخل ہونے سے قبل گودام میں کم از کم 4 گھنٹے کیلئے ہوا کو گزرنانا لازمی ہے۔
- ▶ فیوٹیکیشن کے دوران تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے اجتناب کریں۔
- ▶ رہائشی علاقوں سے متصل کمروں میں فیوٹیکیشن نہ کریں۔
- ▶ ایلومینیم فاسفائیڈ کی بچی ہوئی راکھ کومت سوگھیں، راکھ کو کسی بھی کپڑے دھونے والے پاؤڈر کے ساتھ ملا کر پانی میں ملا دیں اور آبی ذخائر سے دور گڑھا کھود کر دفن دیں۔
- ▶ ایلومینیم فاسفائیڈ کی بچی ہوئی گولیوں کو محفوظ کرنے کیلئے ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں۔

سفارشات برائے استعمال:

گودام کو ہوا بند رکھنے کا دورانیہ	گولیوں کی مقدار	فیوٹیکیشن کا طریقہ	بمطابق وزن	زخیرہ شدہ اجناس کے حشرات
8-10 دن	2-4 گولیاں فی ٹن	زخیرہ شدہ کھلی اجناس	بمطابق وزن	
5-7 دن (10 سے 15 سینٹی گریڈ پر)	3-5 گولیاں فی ٹن	سراپت پذیر پیکنگ میں زخیرہ شدہ اجناس		
4-5 دن (15 سے 20 سینٹی گریڈ پر)	20 گولیاں فی 1000 کمپنٹ	زخیرہ شدہ کھلی اجناس	بمطابق حجم گودام	
3-4 دن (20 سینٹی گریڈ پر)	45 گولیاں فی 1000 کمپنٹ	سراپت پذیر پیکنگ میں زخیرہ شدہ اجناس		

ضروری وضاحت:

- جس گودام کی جگہ میں فیوٹیکیشن کی جارہی ہو اس کا ہوا بند ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گیس مطلوبہ عرصے سے قبل خارج نہ ہو جائے۔
- زہر کا استعمال بمطابق وزن جنس کرنے کی صورت میں گودام پوری طرح بھرا ہونا چاہیے اور خالی جگہ نہ ہونے کے برابر ہو۔
- دباؤ کے تحت پیک کی ہوئی ایشیا، تھمبا کو فیورہ، فیوٹیکیشن کیلئے ایلومینیم فاسفائیڈ کی مقدار کم یعنی ایک گولی فی کعب میٹر کی جاسکتی ہے، لیکن گودام کو لازماً زیادہ عرصے تک ہوا بند رکھنا ہوگا یعنی 25-25 سینٹی گریڈ کے ماحول میں کم از کم 15 دن اور 25 درجے سے زیادہ کے ماحول میں کم از کم 10 دن۔
- کسی بھی شخص کو استعمال شدہ علاقے میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں جب تک کی فاسفائن کی سطح 0.3 پی پی ایم یا اس سے کم نہ ہو جائے تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔



انتہائی آتش گیر

زرعی زہروں کا ذمہ دارانہ استعمال ہماری صحت اور ماحول کا تحفظ



گودام میں بڑوں کے درمیان گولیوں کو مناسب جگہ پر رکھیں۔



استعمال کے وقت حفاظتی کپڑے (چراغ اور دوسری اشیاء
(یکے دوستانے لونگ بوت) ضرور استعمال کریں۔



زہر کو بچوں کی تکلیف سے دور رکھنا ہے۔



استعمال سے پہلے لیبل پڑھی ہوئی ہو یا پتہ غور سے پڑھیں
اور اس پر عمل کریں۔



استعمال کے بعد زرعی زہر کے خالی ڈبوں اور بوتلوں کو
کھانا یا دوا آبی گڑھوں سے دور رکھی جائے اور ہڈی بنانے میں
جلا دیں یا زمین میں دفن کریں۔



زہر کے خالی ڈبوں کو پانی یا کھانے پینے کی چیزوں
کیلئے استعمال نہ کریں۔



کھانے پینے یا پتہ کو بچھڑا کر وقت بڑھا کر اسے نہ کریں۔



زہر کو کھانے پینے کی چیزوں سے علیحدہ رکھیں۔



زہر کا اثر ہو جانے کی صورت میں فوری طبی مشورہ حاصل کریں
اور زہر کا لیبل ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔



اگر زہر چمک جائے تو تیز سے اسے دھو لیں اور جسم کو
صاف سے گھسیں۔



تقلیہ حمل کے دوران زہر کو سفر میں اور کھانے پینے کی
اشیاء سے دور رکھیں۔



آبی گڑھوں کو زہریلی چیزوں سے آلودہ نہ کریں۔

مزید معلومات کیلئے **آرڈیسیٹ لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ** کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس: **ٹھرانڈ، بلاک نمبر 5/A، بی۔ای۔سی۔ ایچ۔ ایس۔ ہاؤس، بلاک نمبر 6، ٹھرانڈ فیمل گراؤنڈ، 753550 کراچی۔** فون: 3-34522611 (21-92+)

ریجنل آفس: **لاہور: 042-3733151، سکس: 041-6537315، ممبئی: 022-3880003، پٹنہ: 091-2964329**

Arystalifsciencepk

www.upl-ltd.com/pk

